

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1647 *Sambucus nigra* L. Sureau noir

- . Arbrisseau ou arbuste de 2 à 6 mètres, à rameaux ligneux, verruqueux-grisâtres, remplis d'une moelle blanche, les jeunes brièvement hispides
- feuilles à 5-7 folioles pétiolées, ovales-acuminées, dentées
- stipules nulles ou très petites
- fleurs blanches, un peu jaunâtres par la dessiccation, très odorantes, disposées en large corymbe plan à 5 branches principales, paraissant après les feuilles
- corolle à lobes ovales-arrondis
- anthères jaunes
- baies noires (rarement blanchâtres) à la maturité. Varie à folioles pennatiséquées, à lanières étroites (*S. laciniata* Mill.).

Écologie Bois, haies, ruisseaux, dans presque toute la France et en Corse.

Répartition Europe ; Caucase et région pontique ; subspontané en Algérie.

Floraison FL juin Fructification septembre

Usages Les fleurs sont employées en infusion comme sudorifiques ; l'écorce et les baies sont purgatives.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Microphanérophytés (8m) ()

Formation végétale : microphanérophytaie

Chorologie : eurasiatique méridional

Inflorescence : cyme multipare

Fruit : drupe

Couleur de la fleur : blanc

sexualité : hermaphrodite

Pollinisation : entomogame

Dissémination : endozoochorie

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !

Identification

Mettez ici ce qui permet d'identifier la plante !

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu
observée le 1 juin 1859
par Herbier Pontarlier-marichal