

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2659 *Scrofularia nodosa* L.

- Plante vivace de 40-80 cm, glabre et verte, à souche renflée-noueuse
 - tige pleine, à 4 angles aigus non ailés
 - feuilles fermes, ovales-lancéolées, aiguës, en cœur ou tronquées à la base non décurrente, dentées en scie à dents inférieures plus grandes, fortement nervées
 - fleurs d'un brun olivâtre, en panicule étroite, nue
 - pédicelles dressés ou étalés, 2-4 fois plus longs que le calice à lobes ovales à peine scarieux
 - corolle de 6-9 mm
 - staminode obovale, tronqué ou émarginé en cœur au sommet
 - capsule de 6-10 mm, ovoïde-conique.

Écologie Lieux humides, dans presque toute la France ; nul dans la plaine méditerranéenne.

Répartition Europe ; Asie occidentale et boréale ; Amérique septentrionale.

Floraison Juin-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytæ

Chorologie : circumboréal

Inflorescence : racème de racèmes

Fruit : capsule

Couleur de la fleur : marron

Floraison : de juin à septembre

sexualité : hermaphrodite

Ordre de maturation : protogynie

Pollinisation : entomogame

Dissémination : barochore

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu
 observée le 5 août 1871
 par Herbier Pontarlier-marichal